

Alberelli Pelargonium zonale e peltatum

No. Sett.	Intervallo Sett.	Lavoro
34-44		piantagione vaso 12 - 16cm
	dopo 2-3 sett.	a piante ben radicate spruzzare leggermente con 0,25‰ GA ₃ ^①
	dopo altre 2-3 sett.	trapiantare nel vaso definitivo da 22 - 28cm, togliere rami laterali alla base, ripetere 0,15‰ GA ₃ sulle foglie alte.
	eventualmente dopo altre 2-3 sett.	se la pianta non ha ancora raggiunto l'altezza voluta, ripetere 0,15‰ GA ₃ sulle foglie alte.
	dopo 4 sett.	togliere le foglie lungo il fusto ^② , spruzzare con 2-3‰ CCC
	dopo 1 sett.	ripetere 2-3‰ CCC
50-4		spuntare ^③
2-8		eventuale 2 ^a spuntatura

^①GA₃ = Gibberellina pura: 0,25‰ (=0,25g/l)

o Gibresol Cifo (flacone da 20ml): 0,25‰ (=1 flacone per 4 litri)

0,15‰ (=1 flacone per 6 litri)

0,05‰ (=1 flacone per 20 litri)

La gibberellina va usata a temperature sopra 16°C e con molta luce (50 klux).

Dissolvere la gibberellina in acqua fredda.

^② Togliendo le foglie lungo il fusto si lasciano 3-4 cm di picciolo, il quale cadrà da solo (togliendo il picciolo per intero si rischiano delle necrosi sul fusto).

Ricacci alla base vanno tolti

^③ Prima della spuntatura lo stelo deve avere 5-6 internodi superiori ravvicinati.

Per gerani e fuchsie il fusto va legato ad un tutore o bastoncino.

GA₃ può essere anche usato per accelerare la crescita di cespugli o piramidi.

Questi consigli di coltura sono di carattere informativo e fatti secondo le nostre esperienze.

Non possiamo assicurare garanzia di successo data la molteplicità delle condizioni culturali delle singole aziende. Informazioni sempre attuali: www.psenner.it.