

Agyranthemum 'Polly'

(Margherita)

Vaso: 10- 12 cm: da gennaio fino a inizio marzo;
14 – 25 cm: da settembre fino a gennaio

Terriccio: consigliamo un terriccio torboso con argilla, pH indicato 5 – 6.

Spuntature: prima spuntatura 1-2 sett. dopo il trapianto

Temperature: fino all'attecchimento della piantina per ca. 2–4 settimane a 18°C;
dopo abbassare a 10–15°C.

Luce: piena luce in primavera, ombreggiare nelle ore piú calde

Irrigazione: irrigazioni regolari, evitare estremi.

Concimazione: sono esigenti, appena le radici sono ben formate concimare il 0,1 – 0,2 % a settimana con un concime equilibrato.

Nanizzante: nanizzare 2 – 3 con Alar (0,3%) 2 settimane dopo la spuntatura. Ripetere ogni 2 – 4 settimane o 1-2 volte 0,05% Topflor, quando la pianta é ben formata.

Inizio fioritura: sono varietà a fotoperiodo lungo. Inizio fioritura inizio/metá aprile.

Malattie – parassiti: I seguenti prodotti si sono disposti compatibili secondo le nostre esperienze:

Rhizoctonia: Monceren 0,1%, Rizolex 0,1%, Ridomil Combi 0,1%

Botryte: Rovral 0,1%, Ronilan 0,1%, Euparen 0,25%, Benlate 0,1%, Scala 0,1%

Mosca bianca: Lannate 0,2%, Decis 0,1%, Applaud 0,1%, Nexter 0,1%, Confidor 0,075%, Keniatox verde 0,08%, Plenum 0,08%

Larve miniatrici: Ambush 0,01%, Decis 0,05%, Vertimec 0,025%

Tripidi: Mesurol 0,2%, Thiodan 0,1%, Folimat 0,1%, Confidor 0,075%, Rody 0,05%, Ambush 0,01%, Decis 0,1%

Non trattare con temperature alte, con pieno sole e terriccio asciutto.

Uso: La Margherita Polly è adatta per alberelli, piramidi e anche vasi piccoli. Si abbina molto bene con petunie Supertunia, Gaura Karalee petite o Bidens Peters Goldrush

Cura: irrigare e concimare regolarmente.

Questi consigli di coltura sono di carattere informativo e fatti secondo le nostre esperienze.

Non possiamo assicurare garanzia di successo data la molteplicitá delle condizioni culturali delle singole aziende. Informazioni sempre attuali: www.psenner.it e www.provenwinners-europe.com.