

## Begonia 'SUMMERWING'

- Vaso:** 12 - 18 cm con 1 pianta: invasare a partire da inizio Gennaio fino fine Febbraio
- Basket:** 14-20 cm con 1 o 2 piante: invasare a partire e da inizio Novembre fino metà Febbraio
- Terriccio:** consigliamo un terriccio ben drenato con argilla e pH indicato 5,5 – 6,5
- Spuntatura:** una spuntatura leggera 2 settimane dopo l'invaso
- Temperatura:** fino all'attecchimento della piantina per ca. 2 settimane a 18-20°C  
Dopo si può ridurre la temperatura a 16-18°C. Con temperature troppo basse si riduce la ramificazione
- Luce:** piena luce, eventualmente 2-4 settimane luce artificiale per allungare il giorno a 16h, per favorire la crescita vegetativa e aumentare la ramificazione.
- Irrigazione:** irrigazioni regolari, evitare estremi – evitare ristagni d'acqua
- Concimazione:** sono abbastanza esigenti, appena le radici sono ben formate (ca. 3 sett. concimare il 0,1 – 0,2 % a settimana con un concime equilibrato. Concimare 1 – 2 volte con chelato di ferro.
- Nanizzante:** nanizzare 1 – 2 volte con Alar (0,3%) a partire da 4 sett. dopo la spuntatura.
- Inizio fioritura:** Prima fioritura inizio/metà Aprile.
- Malattie – parassiti:** trattare subito dopo il trapianto con Previcur 0,15% e Benlate 0,1%.  
I seguenti prodotti si sono disposti compatibili secondo le nostre esperienze:
- |                   |   |
|-------------------|---|
| Rhizoctonia:      | Monceren 0,1%, Rhizolex 0,1%, Ridomil Combi 0,1%  |
| Botrytis:         | Rovral 0,1%, Ronilan 0,1%, Euparen 0,25%, Benlate 0,1%, Scala 0,1%  |
| Peronospora:      | Previcur 0,15%, Fonganil 0,05%  |
| Mosca bianca:     | Lannate 0,2%, Decis 0,1%, Applaud 0,1%, Nexter 0,1%, Confidor 0,075%, Keniattox verde 0,08%, Plenum 0,08% |
| Larve miniatrici: | Ambush 0,01%, Decis 0,05%, Vertimec 0,025%  |
| Tripidi:          | Vertimec 0,05%, Mesurol 0,2%, Tamaron 0,1%, Thiodan 0,1%, Folimat 0,1%.                                   |
- Uso:** piante da fiore per balconette, basket vasi ed aiuole in pieno sole, pianta resistente che fiorisce tutta l'estate. Può essere abbinata con Diamond Frost, gerani parigini, Bidens e Sutera
- Cura:** irrigare e concimare regolarmente.

Questi consigli di coltura sono di carattere informativo e fatti secondo le nostre esperienze.

Non possiamo assicurare garanzia di successo data la molteplicità delle condizioni culturali delle singole aziende. Informazioni sempre attuali: [www.psenner.it](http://www.psenner.it) e [www.provenwinners-europe.com](http://www.provenwinners-europe.com).