

Bracteantha bracteatum 'SUNDAZE'

(Sin.: Helichrysum bracteatum)

- Vaso:** 16 - 20 cm con 1 pianta: invasare a partire da novembre,
8 - 14 cm con 1 pianta: invasare da gennaio a fine febbraio per una fioritura da metà marzo
- Terriccio:** consigliamo un terriccio ben drenato con argilla e pH indicato 5,5 – 6,5
- Spuntatura:** una spuntatura leggera 1-2 settimane dopo l'invaso
- Temperatura:** fino all'attecchimento della piantina per ca. 2 settimane a 14–16°C
Dopo consigliamo di ridurre la temperatura per ca. 2 settimane a 12-14°C e poi a 6 – 8°C fino a fine coltura per avere delle piante robuste e compatte.
- Luce:** piena luce.
- Irrigazione:** sono abbastanza esigenti, irrigazioni regolari, evitare estremi – non tenerle né troppo asciutte (può causare foglie gialle), né troppo bagnate.
- Concimazione:** sono abbastanza esigenti, appena le radici sono ben formate (ca. 3 sett. concimare il 0,1 – 0,2 % a settimana con un concime equilibrato (preferibilmente con poco fosfato: 20-10-10). Concimare 1 – 2 volte con chelato di ferro.
- Nanizzante:** non necessario se coltivate a temperature basse. Altrimenti nanizzare 1 – 2 volte con CCC (0,15%) o Alar (0,3%) (a partire da 2 sett. dopo la spuntatura).
- Inizio fioritura:** sono varietà a fotoperiodo lungo. Prima fioritura metà marzo.
Per anticipare la fioritura aumentare per 2-3 settimane le temperature a 14-16°C
- Malattie – parassiti:** trattare subito dopo il trapianto con Previcur 0,15% e Benlate 0,1%.
I seguenti prodotti si sono dimostrati compatibili secondo le nostre esperienze:
- | | |
|-------------------|--|
| Rhizoctonia: | Monceren 0,1%, Rhizolex 0,1%, Ridomil Combi 0,1% |
| Botrytis: | Rovral 0,1%, Ronilan 0,1%, Euparen 0,25%, Benlate 0,1%, Scala 0,1% |
| Peronospora: | Previcur 0,15%, Fongamil 0,05% |
| Mosca bianca: | Lannate 0,2%, Decis 0,1%, Applaud 0,1%, Nexter 0,1%, Confidor 0,075%, Keniatox verde 0,08%, Plenum 0,08% |
| Larve miniatrici: | Ambush 0,01%, Decis 0,05%, Vertimec 0,025% |
| Tripidi: | Vertimec 0,05%, Mesuroil 0,2%, Tamaron 0,1%, Thiodan 0,1%, Folimat 0,1%. |
- Uso:** piante da fiore per vasi ed aiuole in pieno sole, rimangono compatte e fioriscono tutta l'estate.
- Cura:** irrigare e concimare regolarmente.
Questi consigli di coltura sono di carattere informativo e fatti secondo le nostre esperienze.
Non possiamo assicurare garanzia di successo data la molteplicità delle condizioni culturali delle singole aziende. Informazioni sempre attuali: www.psenner.it e www.provenwinners-europe.com.