

Pelargonium grandiflorum 'SURFIN'

Vaso: 12 a 16 cm, invasare da settembre a metà gennaio per una fioritura da metà/fine marzo
Vaso 10 a metà dicembre a fine gennaio

Terriccio: consigliamo un terriccio ben drenato con pH indicato 5-6, preferibilmente con perlite o polistirolo.

Spuntatura: spuntare 2-3 settimana dopo l'invaso.

Temperatura: fino all'attecchimento della piantina per ca. 2-5 settimane a 16–18°C
Dopo consigliamo di ridurre la temperatura a 8-10°C per indurre le piante e aumentare la formazione dei fiori. Con temperature basse la qualità migliora e si evitano rami troppo lunghi.

Luce: piena luce non ombreggiare.

Irrigazione: irrigazioni regolari, colpi di siccità fanno ingiallire le foglie.

Concimazione: appena le radici sono ben formate (ca. 3 sett.) concimare il 0,2 – 0,3 % (2-3 g/litro) a settimana con un concime equilibrato.

Nanizzante: normale/alto 2-3 volte con Alar 0,3% o Topflor 0,05% .

Inizio fioritura: fine marzo inizio aprile.

Malattie – parassiti: I seguenti prodotti si sono dimostrati compatibili secondo le nostre esperienze:

Rhizoctonia Monceren

Botryte: Rovral 0,1%, Ronilan 0,1%, Euparen 0,25%, Benlate 0,1%, Scala 0,1%, Pomarsol 0,2%

Mosca bianca Lannate 0,2%, Decis 0,1%, Applaud 0,1%, Nexter 0,1%, Confidor 0,075%, Keniatox verde 0,08%, Plenum

Tripidi: Mesuroil 0,2%, Thiodan 0,1%, Folimat 0,1%, Confidor 0,075%, Rody 0,05%, Ambush 0,01%, Decis 0,1%

Switch e Scala potrebbero causare danni alle piante

Non trattare con temperature alte, con pieno sole e terriccio asciutto.

Uso: piante da fiore con colori eccezionali per vendita in primavera. Grande vendita per Pasqua e festa della mamma

Cura: irrigare e concimare regolarmente, temperature basse prolungano la fioritura

Questi consigli di coltura sono di carattere informativo e fatti secondo le nostre esperienze.

Non possiamo assicurare garanzia di successo data la molteplicità delle condizioni culturali delle singole aziende. Informazioni sempre attuali: www.psenner.it e www.provenwinners-europe.com.